

# Jouw 5 momenten van handhygiëne

## Een patiënt met een postoperatieve wond



## Belangrijke aandachtspunten voor postoperatieve wonden

- Vermijd overbodige aanrakingen van de postoperatieve wondomgeving, ook door de patiënt.
- Draag handschoenen als je contact met lichaamsvocht verwacht; ook wanneer je handschoenen draagt, blijft de handhygiëne noodzakelijk, zoals de 5 momenten van de WHO voorschrijven.
- Volg de lokale procedures voor het gebruik van aseptische technieken zonder aanraking om het verband te vervangen/de wond te behandelen.
- Raak het verband ten minste 48 na de operatie niet aan, tenzij in het geval van lekkage of andere complicaties.
- Het normale postoperatieve wondverband moet een basistype zijn (bv. absorberend verband of verband met lage hechting).
- Wanneer de zorgverlener de patiënt benadert om een wond te onderzoeken, kan hij/zij ook andere taken uitvoeren (bv. een veneuze katheter openen, bloedmonsters nemen, een urinekatheter controleren). Voor en na deze specifieke taken kan handhygiëne nodig zijn en moeten bijvoorbeeld momenten 2 en 3 worden herhaald (zie de specifieke 5 momentenposters van de WHO voor het beheer van lijnen of katheters).
- Indien geïndiceerd moet preoperatieve chirurgische antibioticaprofylaxe worden toegediend in een enkele parenterale dosis, 2 uur of minder voor de chirurgische insnijding en rekening houdend met de halveringstijd van het antibioticum. Blijf geen chirurgische antibioticaprofylaxe toedienen na afloop van de operatie.
- Antibioticatherapie voor een aangetoonde infectie van de chirurgische omgeving moet in het ideale geval worden toegediend op basis van een kweek van een wondmonster en de gevoeligheidsresultaten.
- Tekenen en symptomen van wondinfectie zijn: pijn of gevoeligheid, lokale zwelling, erythem, hitte of etterige afscheiding uit de oppervlakkige insnijding.
- Deze richtlijn geeft geen informatie over gecompliceerde postoperatieve wondzorg, die specifieke behandelingen of therapieën kan vereisen.